AVERTISSEMENTS

BAGRICOLES

LORRAINE

Bulletin n° 19 du 7 septembre 1995

GRANDES CULTURES

Les pucerons

Ils transmettent le virus de la JNO (jaunisse nanisante de l'orge). Deux possibilités vous sont offertes : Protéger systématiquement les semences en les traitant avec un insecticide (Gaucho). Si les conditions ne sont pas favorables aux pucerons, cette protection risque de ne servir à rien et de ne pas être rentabilisée. • Attendre l'arrivée des pucerons dans les parcelles et ne traiter que si nécessaire. Nous vous informerons de la situation dès la levée des premières céréales.

Les cicadelles

Elles ont produit beaucoup plus de "bruits" que de dégâts. Les traitements ont toujours été inutiles jusqu'à présent. Nous vous tiendrons informés de leur évolution durant l'automne.

Les mauvaises herbes

De nombreux produits ont un large spectre d'activité permettant de répondre à la plupart des problèmes posés par les adventices. Deux possibilités sont offertes:

- Traitements de pré-levée. Ils ont l'avantage d'éliminer toute concurrence mais exigent un certain nombre de conditions pour être réussis : • bien connaître la flore présente dans la parcelle, •un lit de semence bien préparé, homogène et non motteux, •des semences enterrées de manière régulière, •un sol suffisamment humide mais non gorgé d'eau.
- post-levée • Traitements de d'automne. Ils permettent d'adapter les produits à la flore effectivement présente. Ils exigent également certaines conditions pour obtenir une efficacité maximale: •désherber les adventices à des stades jeunes, •mettre à profit des périodes suffisamment humides et douces pour une action maximale du produit, •éviter les traitements durant des périodes avec des écarts de températures trop importants (gel et dégel).

Colza

Les colzas lèvent. La plupart sont au stade cotylédons. Les plus avancés atteignent le stade 2 à 3 feuilles.

Attention aux limaces

Les limaces sont importantes cette année et les attaques déjà visibles. Les conditions sont favorables à leur développement, surtout dans les parcelles présentant des interstices permettant leur circulation (pierres, mottes,...).

Surveiller attentivement et régulièrement vos parcelles. Intervenir dès les premières captures.

Altises

Surveiller attentivement vos cuvettes jaunes pour détecter le début du vol. Ce parasite est resté relativement discret, en général, sur la Lorraine depuis quelques années. Les attaques ne se font souvent que ponctuellement dans quelques parcelles. Il est donc impératif de placer des cuvettes dans vos parcelles. N'intervenir que si 3 pieds sur 10 présentent des morsures. Le traitement devient inutile après le stade 2 feuilles vraies du colza.

Céréales

Eviter les pièges de l'automne! Les premiers semis de céréales vont intervenir dans les prochaines semaines. Plusieurs ennemis guettent vos jeunes céréales jusqu'à leur arrêt végétatif hivernal.

Les Limaces

Elles risquent d'être nombreuses et doivent être surveillées avant et après le semis. Les meilleures efficacités ont été enregistrées en faisant deux applications : la première 8 jours environ avant le semis, •la deuxième en mélange avec la semence au semis.

acides, lessives..., non homologués, qui risquent de changer le mode d'action des produits phytosanitaires et pourraient devenir dangereux pour les utilisateurs et la plante cultivée (voir notre bulletin n° 18 du

Limaces : Dégâts

Altises: Surveiller.

premiers ennemis.

mélanges avec des

produits tels que les

Céréales : Les

Attention aux

importants.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



350 F

24 août.

Imprimerie de la Station de Nancy - Directeur-gérant : D. VERBEKE - Publication périodique CPPAP Nº 2011 AD - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation

ABONNEMENT ANNUEL